

Observation

~~Sur Deux Hernies Complètes~~

Changements que les anciennes hernies apportent
à la disposition naturelle des parties.

M^r Bouquet
2^e me.
Un homme presque octogenaire portoit depuis 20 ans
2 hernies Complètes d'un volume Considérable Complicques
chaque d'une hydrocele dans les membranes propres du
testicule. Le malade avoit toujours négligé de réduire ces
hernies et de les maintenir réduites comme il lui étoit possible
dans le commencement, et même depuis plusieurs années que
l'adhérence des parties rendoit la réduction des parties
impossible, il n'avoit pris aucune précaution ~~pour~~ Pour prévenir
l'accroissement de ces tumeurs en faisant un léger effort
pour se mettre à genoux, il s'appuyoit de la chute de
quelques parties, qui se précipitoient tout à coup et avec
bruit dans les bourses, et peu à peu il sentit une douleur
très vive dans la hernie, du côté gauche, dont le
volume augmenta sensiblement.

Mandé par le malade, j'eus tenté la réduction
de la nouvelle portion d'intestin ou d'épiploon que je soupçon-
nois glissée dans la tumeur; mais peu y réussis, j'eus
recours aux saignées, aux fomentations, et aux cataplasmes
émollients, le même jour tous les symptômes de l'étranglement
se dissipèrent. Des matières fécales, la tension douloureuse

De ventre, la fièvre, le hoquet et les vomissements
 survinrent, je fis ventouses les saignées et continuai les
 topiques, j'ordonnai un lavement, mais il fut impossible de le
 faire passer de quelque adresse qu'on usât. Les accidents augmentèrent
 de plus en plus, les vomissements devinrent bilieux et plus
 fréquents, et le ventre parut beaucoup plus tendu et plus
 douloureux.

Je crus d'abord devoir parvenir le malade sur la nécessité
 d'une opération mon dessein n'étoit pas cependant d'ouvrir
 l'intestin l'hernie, pour réduire les parties qui depuis
 nombre d'années étoient habituellement dans cette tumeur;
 cette opération eût été toute inutile et d'ailleurs très périlleuse,
 tant à cause du volume de ces parties et de leur adhérence,
 qu'à cause du grand âge et de la faiblesse du malade.
 J'avois seulement en vue la portion d'intestin que je
 croyois nouvellement sortie du ventre. J'avois découvert le
 sac vers le haut, et sans l'ouvrir j'avois dilaté l'anneau
 après pour remédier à l'étranglement, et réduire la portion
 d'intestin engagée en dernier lieu dans la tumeur. Le
 malade ne voulut point consentir et mourut le cinquième
 jour de l'étranglement.
~~Le malade ne voulut point consentir et mourut le cinquième
 jour de l'étranglement. Je ne consentis point à l'opération et comme il avoit en
 différents temps éprouvé des douleurs assez violentes que
 de la part de l'hidrocele du même côté, il se flatta
 que celle qui venoit d'être guérie avoit la même cause et qu'il
 en seroit quitte comme à l'ordinaire pour une simple
 gonorrhée. Dans cette idée il me pressa fortement de le
 lui faire et j'y consentis plutôt pour lui complaire~~

que dans l'espoir de lui prouver le soulagement qu'il
 attendoit. Je prevoiois bien qu'il n'en seroit d'autre avantage
 que celui d'être déchargé d'une légère quantité d'eau qui n'avoit
 pas grande part à la situation fâcheuse dans laquelle il se
 trouvoit; mais je contois ^{que l'opération de} ~~quelques~~ ^{quelques} ~~transpiration~~ ^{quelques} l'insolence de la
 ponction, il seroit aux instances que je lui faisois de
 se soumettre à une opération qui étoit devenue indispensable
 et continua de me résister, et mourut le cinquième jour de
 sa maladie,

Je fis l'ouverture du cadavre, et je trouvais tous les intestins
 grisâtres noirs et livides, le plicon étoit tout attiré jusqu'à ses
 attaches au fond de l'estomac une portion de l'iléon qui
 étoit vraiment gangrenée de même que la partie du
 mézenter qui se soutenoit alloit former la hernie du
 côté droit, le reste de la tumeur étoit une hydrocele
 qui renfermoit une assez grande quantité de serosité jaunâtre
 et n'avoit rien de remarquable. Mon glorieux foyers
 dont le principal étoit dans le péricrète et communicoit
 par une ouverture sensible dans quelques autres foyers
 ou celés considérablement dilatés,

Je vis différentes portions d'intestins, qui engagés dans
 l'anneau du côté gauche alloient se rendre dans la hernie
 du même côté; ce fut sur pris d'apprendre que le rectum
 étoit du nombre de ces intestins; j'ouvris la tumeur et je
 vis quelle contenoit 1^o une partie de l'iléon, qui étoit entièrement
 gangrenée, 2^o toute la B. du colon qui étoit adhérente dans
 plusieurs endroits du sac herniaire; son diamètre étoit
 augmenté du double, et les tuniques avoient près de trois



signes d'épaissir, enfin le rectum lui-même avoir été
 rectilinéairement entraîné dans la hernie, en conséquence d'effort
 qui avoit suffi par le poids des matières amassées dans l'S. du
 colon et par les efforts de ces matières contre les parois de cet
 intestin, l'arrangement du rectum faisoit l'obstacle qui opposoit
 au passage des aliments, le fond de la vésie se trouvoit
 appliqué intérieurement au bord de l'anneau contre lequel elle
 sembloit être poussée par le rectum, qui passant par
 dessus se courboit pour aller gagner la hernie. une bande
 membranuse formée par le péritoine, partoit du fond
 de la vésie, et se prolongeant vers la hernie, sembloit
 concourir à la formation du sac, au moyen de ce prolongement
 membranux, la vésie étoit tirée vers l'anneau, de sorte que
 par la suite elle avoit peut-être aussi été entraînée avec elle dans
 la hernie, l'indivision du même côté n'avoit rien de particulier.

J'ai cru devoir faire dessein ces parties. Dans la première
 figure on voit les deux hernies présentées par la partie
 postérieure. A La hernie du côté droit;

B La hernie du côté gauche;

C portion de l'iléon, qui va former la hernie du côté droit;

D portion de l'iléon qui concourt à former la hernie du côté gauche;

E portion du colon;

F le rectum;

G la courbure sur la vésie;

La seconde figure représente par la partie antérieure
 les deux ^{hernies} parties qui sont opposées à la partie qui y ont
 rapport

A La hernie du côté droit

- B foyer de l'hydrocele,
 c Ouverture dans une des cloisons,
 D portion de l'iléon qui forme l'hernie droite
 a hernie du côté gauche,
 e Rente de l'hydrocele,
 e portion de l'iléon,
 f portion du colon,
 Portion du rectum,
 K la courbure
 D bandes membraneuses qui en deux parts attachées au fond
 de la vésicule, et qui de l'autre se rendent au sac herniaire
 la vésicule dont le col est retenu pour faire voir la courbure
 du rectum,



Observation Donnée

par Monsieur Sauter grefier de
M^r Le premier chirurgien à
Montpellier

Une femme de ~~esprit~~ affligée d'une hernie qui s'étendoit
depuis lanneau de l'oblique externe jus qu'au bas de la
Lèvre de ^{et qui} la vulve, étoit gangrenée ~~sur~~ par la plication
des remèdes astringents, soit par les efforts qu'on avoit fait
inutilement pour la réduire, ^{en est} et fut portée ~~à l'hôpital~~
à l'hôpital St. Eloy. ~~Après~~ ^{Après} m'en être la tumeur pour l'examiner
elle se détacha entièrement ^{et} se séparant ensemble non
seulement les téguments avec une portion de la vulve
mais une partie de lanneau et de l'intestin encore plein
de matière focale j'énetoyai cette partie et achevai d'importer
quelques lambeaux gangreneux sans des téguments des muscles
que de l'intestin et du mézenter, ensuite je fis deux points
d'éguille pour appujeter ces deux orifices aux bords de la plaie
espérant que si la malade ne guérirait point de cette maladie
elle en seroit quitte pour rendre les excréments par une espèce
d'anus que la nature formeroit en ce lieu comme on en a
des plusieurs exemples, mais la malade fut encore plus
heureuse, puis que quinze jours après l'intestin étant colé
et vainy avec les lèvres de la plaie, je coupay les fils
qui tenoient ces deux orifices assujettis et jeus soin de les

tenu mollement Dilaté, alors et de jour en jour jusqu'à la
 satisfaction de voir accroître les chairs de toutes parts & réunir
 un orifice de l'intestin à l'autre et les deux ensemble avec la
 playe, qui se consolida au point que le bout de trois mois
 le malade ne sentait plus d'écoulement par la playe & ne
 que lorsqu'elle est constipée ou qu'elle a fait quelque excès
 il se fait une petite crevasse à la playe par laquelle elle rend
 des matières Ancales de la grosseur d'une petite olive, mais
 par le seul régime & petit tout se reforme bientôt et
 il ne sort plus rien que par les voyes ordinaires.



Observation

Monsieur Collignon Le fils a rapporté
 que son père fut en la présence d'une
 hernie crurale a une Demoiselle de 16 ans, l'étranglement
 et les accidents qui les accompagnoient durs depuis 9 ou 10
 jours pendant les quels temps, le malade parut
 n'avoir rien voulu faire, ny se laisser examiner
 qu'enfin cédant aux instances de ses parents et encoire plus
 a la douleur, elle consentit a tout ce que son jugea a propos
 de faire pour la guérir.

Monsieur Collignon père ayant ouvert le sac herniaire trouva
 une assez petite portion d'intestin, mais adhérent par
 la partie basse de l'anneau la couleur n'en devoit pas quelle
 fut considérablement ~~atteinte~~ atteinte, l'intestin fut redressé et
 maintenu selon la méthode ordinaire, les accidents disparurent,
 et les fonctions se rétablirent, et nous crûmes la malade
 hors de danger, lors que sur la fin du quatrième jour
 de l'opération le malade eut de la fièvre, et souffrit de
 violentes douleurs dans le bas ventre, qui parut même en
 peu de jours, on trouva l'appareil humecté d'une matière très
 fluide puante, l'appareil étant levé, il sortit des matières
 crurales mal digérées qui conservoient encore quelque forme
 des aliments que le malade avoit pris, on jugea que quoique
 l'intestin n'eût point grandement été atteint il avoit
 cependant été percé a quel point formé un trou par le quel
 étoient écoulées les matières, quoique la malade nous parut

45

In Danger apendur après es evacuations tous les accidents
apens, on pança la playe simplement on fit vivre la
malade avec des aliments capables de nourir en petite quantité
comme gelée, gelées Dorée, granade, & autres, Les matières
coulerent par la playe quarante ou cinquante jours mais
diminuerent peu à peu, la malade fut entièrement guérie
au bout de deux mois;

à toutes les fois qu'un intestin parviendrait noir, il n'est pas pour
à cela gangrené, ou du moins la pourriture n'attaque que les tuniques
à extérieures; de sorte qu'on ne doit se déterminer à retrancher une
à portion d'intestin, que quand on est bien assuré que la gangrene
à en traverse toutes les membranes. on en trouvera une preuve
à suffisante dans l'observation qui suit.

Mr Benoist
chirurgien de
Dunquerque

D. VII. un homme âgé de me manda, étant depuis treize jours
attaqué d'un vomissement de matières focales, et des autres
symptômes de l'étranglement d'une hernie complète dont on avoit
à différentes reprises inutilement tenté la réduction, se fit l'opération
et se trouva l'intestin fort noir dans l'étendue d'un demi pied; se
le remis cependant dans le ventre; j'ai été pendant plusieurs jours
dans la crainte qu'il ne mourût, mais le malade est guéri tout
heureusement, et sans qu'il y ait eu par la plaie issue de matières
focales; il est seulement sorti par le trou de l'anneau pendant quelques
jours une supuration assez abondante dans laquelle on distinguoit de
petites pellicules ou membranes détachées par la supuration.

à On pourroit mettre en question si dans un cas tel que celui-ci
à il n'eût pas été plus sûr de laisser l'intestin au dehors
à après avoir suffisamment dilaté l'anneau; quoiqu'il en soit
à nous allons voir que dans le cas même où l'intestin survit
à après avoir été réduit, il ne faut point encore desespérer du
à malade.



Monsieur Bourgoüin Chirurgien juré
 D'auvergne sur une fausse copie que Semblable nous ne le
 rapporterons point en entier,
 J'ay fait l'opération de la hernie inguinale à une
 femme de 50 ans, elle portoit cette hernie depuis 25 ans
 avoir toujours négligé de se servir d'un bandage convenable,
 elle faisoit elle même rentrer sa hernie lors quelle luy
 causoit des douleurs, des Coliques, ou quelle pouvoit entendre
 le trépanement, un jour quelle portoit du pain elle
 sentit une douleur de Colique beaucoup plus violente
 que celles quelle avoit l'habitude de ressentir, Les efforts
 quelle fit pour la réduire furent inutiles, et comme elle
 les proportionna à la résistance, les parties furent meurtries
 et froissées, l'inflammation survint, et les symptômes
 de l'étranglement parurent bientôt, mais quoi qu'ils ne luy
 donnassent que peu de relache, elle ne se détermina à
 demander du secours que le troisième jour de l'étranglement,
 un chirurgien de Village fut envoyé, La saignée plusieurs
 fois et appliqua des Cataplasmes sur la tumeur fit
 ensuite quelques tentatives pour la réduire mais sans succès,
 Le quatrième je fus mandé pour faire l'opération, Les
 premiers accidents subitoyens, La tumeur mençoit de
 pourrir et la gangrene étoit dans l'intérieur, puis qu'à
 l'ouverture de la tumeur je trouvay l'intestin noir

La paille ne pouvant contenir les excréments dont il
sortit une si grande quantité que le lit en fut inondé, je
voulus tirer un peu au dehors la partie de l'intestin que
je soupçonnais être correspondante à l'ethome, mais elle étoit
heureusement adhérente, je séparay ce que je pus de la
poussière et je pansay cette plaie le plus mollement qu'il
me fut possible, pour obtenir que la réunion se fit en ce
lieu et que la malade en fut quitte pour rendre dans la
suite les excréments par un nouvel anus, que j'espérois voir
se former dans l'aine, mais j'ai été trompé favorablement
puis qu'après la chute des escarres gangreneuses, toutes les parties
se sont réunies sans former une cicatrice (sans fistule) si parfaite
que la malade n'y a senti depuis aucune indisposition.

Des suites.

~~Des suites.~~ L'opération La malade rendit une grande
quantité de matières Ancales par ce qui y eut quinze jours
qu'elle n'avoit été à la selle en comptant les treize ou quatorze
qu'elle avoit été dans l'étranglement.

Le vomissement ne cessa que le troisième jour. Le quatrième
elle rendit par la plaie des rognons de quelques morceaux
qu'elle avoit mangé la veille.

La malade commença d'aller à la selle le 6^e jour
après l'opération et depuis, l'appareil ne fut plus
mouillé que du pus ordinaire de sorte que le 25^e jour
elle fut parfaitement guérie.

Observation De
Chirurgie, sur une hernie Crurale
Une femme âgée d'environ 65 ans, de faible tempé-
rament se trouva atteinte le vingt six janvier 1732
d'une Colique considérable accompagnée de vomissemens
fréquens, elle passa deux jours entiers dans cet état
sans se faire à personne, ces accidens continuant je
fus mandé pour la voir, elle mourut avec assez de
peine que depuis plusieurs années elle étoit incommodée
d'une descente, que malgré un bandage qu'elle portoit
habituellement, les parties sechaioient souvent à qui
la jetoit dans les accidens du étranglement.
elle étoit dans l'habitude de réduire la descente,
mais depuis quelque temps elle ne pouvoit tout réduire, il
y avoit toujours une petite grosseur sur la quelle

[illegible]

Trois jours se passent dans cette tranquillité sans qu'il arrive aucun changement notable à la tumeur, j'ay en différents temps de la faire la réduction & toujours sans succès.

Vers le huitième jour, les accidents reparurent avec plus de violence, je sentis la neussité qu'il y avoit d'en venir a l'operation, j'engageay trois de mes confreres a voir la malade, tous se trouvant de même avis sans sur la nature de la maladie que sur la



nécessité d'opérer que sur le gres de l'œuf qu'on en
pouvoit attendre, en effet la mauvaise disposition
où se trouvoit le fœtus plus épaisse, mûre par de
longues fatigues que par l'âge ne donnoit point d'espe-
rance. Cependant pour ne la point abandonner à une
mort certaine, nous nous déterminâmes à faire
l'opération, Me étoit l'unique moyen qui pût être
tenté pour l'opération;

Après avoir ouvert la peau qui recouvroit la
tumeur et séparé les autres graisseuses, je découvris
le sac herniaire qui étoit de la grosseur d'un œuf
de poule, je le trouvay adhérent dans toute la partie
postérieure, avec les vaisseaux cruraux, j'en détachay
les adhérences avec beaucoup de difficulté, mes sen-
sations étoient très dures, et très épaisses, après l'ouverture
du sac dans lequel il ne se trouva aucune
viscité, la première partie qui se présenta fut
un pecton de graisse que nous reconnûmes être une
portion d'épiploon pectonné adhérent à lui-même
et à toutes les parties du sac, après l'avoir séparé
autant qu'il fut possible je trouvay dans son milieu
une appendice ou portion d'intestin formé par
une portion du Canal de l'intestin deon, je dis
une portion, parce qu'il y restoit fibre environ
un tiers du Canal de cet intestin, qui n'étoit

joindre Compris Dans la hernie, l'appon paser les
 excréments, cette appendice avoit enfoncé une poulce d'étendue
 pour la réduire Dans le ventre il falloir détruire
 l'obstacle qui s'opposoit à leur réduction et qui faisoit
 l'étranglement. C'étoit cette bande aponévrotique nommée
 ligament de Fallope, je le coupay autant qu'il y eût lieu
 = avais, alors notre opération eut été faite ou du moins
 bien avancée sans les étroites adhérences de l'intestin
 au sac et du sac aux vaisseaux cruraux. Mes efforts
 si minces et si faibles qu'il y avoit un danger très grand
 de tenter leurs séparations, mais comme nous avions remédié
 à l'accident principal qui étoit l'étranglement et qu'au
 moyen de cette dilatation l'intestin se trouvoit bien
 placé et se cauto entièrement libre, nous nous contentâmes
 de le maintenir par une pelotte très molle trempée dans
 un mélange d'huile d'amandes douces, et le jaune d'œuf
 le reste de la plaie fut garni de charpie brute le tout
 recouvert de compresses et assujéty d'un bandage.

Notre pronostique fut malheureusement justifié. Le
 malade mourut dix heures après l'opération. par
 l'ouverture que je fis du corps je massai de ce que nous
 n'avions vu qu'imparfaitement et de l'impossibilité qu'il y
 avoit eu, de séparer l'intestin du sac et le sac d'avec
 les vaisseaux cruraux sans risquer d'entamer l'un ou l'autre
 de ces parties,



Estime quel en prudem les parties ne vien
hazarder le quel y a Leu Desperu que par la supuration
les parties pourrout se detacher Les uns Des autres, et
reprenre Leurs Situations naturelles.

